

 vacinas.net



Conectamos **você**,
a quem **faz a vacinação**.

CATÁLOGO DE PRODUTOS



Vacina **BCG**

A Tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e/ou sistemas.

A forma extrapulmonar, que acomete outros órgãos que não o pulmão, ocorre mais frequentemente em pessoas que vivem com HIV, especialmente aquelas com comprometimento imunológico.

• **O que previne?**

Previne a Tuberculose, principalmente suas formas graves (miliar e meníngea), mais frequentes em crianças abaixo dos 5 anos de idade.

Faixa etária:

A vacina é indicada de rotina a partir do nascimento até antes da criança completar 5 anos de idade.

Esquema de doses:

Ao nascer, até antes de a criança completar 5 anos de idade.

Sintomas:

Tosse na forma seca ou produtiva, febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento, cansaço/fadiga.

Outras recomendações:

Pessoas de qualquer idade que convivem com portadores de hanseníase (lepra); estrangeiros ainda não vacinados e que estejam de mudança para o Brasil.



Vacina **VARICELA** (CATAPORA)

A Catapora (Varicela) é uma infecção viral altamente contagiosa que causa uma irritação cutânea com bolhas na pele e é transmitida pelo contato com saliva ou secreções respiratórias, lesões de pele e mucosas e objetos contaminados.

• O que previne?

Vacina para prevenção da Catapora, doença causada pelo vírus Varicela Zoster.

Faixa etária:

Indivíduos com mais de 12 meses de idade.

Esquema de doses:

Crianças: 1 dose aos 12 meses e reforço com intervalo de 3 meses entre as doses.

Adolescentes, adultos e idosos: 2 doses com intervalo de 30 dias.

Sintomas:

Febre, dor de cabeça, cansaço e erupção cutânea acompanhada de coceira.



Vacina **TRÍPLICE VIRAL**

O Sarampo é uma doença viral aguda, altamente transmissível de pessoa a pessoa por via respiratória.

A Caxumba é uma doença viral aguda que afeta primariamente a glândula parótida. É altamente transmissível através da saliva ou de secreções provenientes da orofaringe.

A Rubéola é uma doença viral aguda, altamente transmissível de pessoa a pessoa por via respiratória, que evolui com febre alta e erupção cutânea.

• O que previne?

Vacina tríplice para prevenção contra os vírus do Sarampo, Caxumba e Rubéola.

Faixa etária:

A vacina é indicada para todas as pessoas a partir dos 12 meses de idade.

Esquema de doses:

Crianças devem receber a primeira dose da vacina a partir dos 12 meses de idade e a dose de reforço com um intervalo mínimo de 3 meses (aos 15 meses ou entre 4-6 anos de idade).

Adolescentes e adultos (nunca vacinados e que nunca contraíram as doenças) devem receber duas doses da vacina, com intervalo mínimo de um mês entre elas.

Sintomas:

Sarampo: Evolui com febre alta, erupção cutânea e comprometimento do estado geral, podendo causar complicações graves como pneumonia, encefalite e morte.

Caxumba: Os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça, dor muscular e inchaço da glândula parótida.

Rubéola: Febre alta e erupção cutânea. A gravidade se dá quando ocorre em gestantes (principalmente nas primeiras 16 semanas de gestação).



Vacina

ROTAVÍRUS

Rotavírus é um género de vírus de RNA bicatenário da família Reoviridae.

É umas das principais causas de diarreia grave em lactentes e crianças jovens, e é um dos diversos vírus que causam infeções comumente chamadas de gastroenterites.

• O que previne?

Vacina para prevenção da Gastroenterite infecciosa por Rotavírus, que atinge principalmente bebês e crianças pequenas.

Faixa etária:

Bebês de 6 semanas a 7 meses e 29 dias.

A primeira dose deve ser obrigatoriamente aplicada até a idade de 3 meses e 15 dias e a última dose até os 7 meses e 29 dias.

Esquema de doses:

Crianças a partir de 6 semanas de idade: três doses, com intervalo de 2 meses.

Esquema padrão: 2, 4 e 6 meses de idade.

Sintomas:

Provoca diarreia intensa e vômitos que podem levar à desidratação, sendo um dos principais motivos de hospitalização nos primeiros anos de vida.



Vacina

PNEUMOCÓCICA

A doença pneumocócica é caracterizada por infecções nos pulmões e ouvidos, por meningite e infecções do sangue (bacteremia e sepsis).

Transmitida de pessoa a pessoa através da via respiratória.

• O que previne?

Prevenção contra a Doença Pneumocócica.

O pneumococo possui várias “cepas” que podem causar diferentes doenças como otite, pneumonia e meningite.

Vacina Pneumocócica Conjugada 13-Valente

Faixa etária:

Uso adulto e pediátrico a partir de 6 semanas de idade.

Esquema de doses:

Crianças a partir de 6 semanas a 6 meses de idade: 3 doses, preferencialmente aos 2, 4 e 6 meses de idade, com intervalo mínimo de pelo menos um mês.

A quarta dose (reforço) é recomendada aproximadamente aos 12 meses de idade.

7 a 11 meses: 2 doses com intervalo mínimo de 4 semanas e uma dose de reforço entre 12-15 meses.

12 a 23 meses: 2 doses com intervalo mínimo de 2 meses.

4 meses a 5 anos incompletos: 1 dose sem reforço.

Adultos e Idosos: Dose única.



Vacina **DTPa**

A Difteria é uma doença aguda, de transmissão respiratória, causada por bactéria que produz uma toxina que leva à formação de uma membrana espessa na parte posterior da garganta (podendo causar asfixia), paralisia, insuficiência cardíaca e até mesmo à morte.

O Tétano é uma doença causada pela toxina da bactéria *Clostridium tetani*, presente na poeira de áreas urbanas e rurais. A infecção ocorre através de ferimentos, normalmente profundos e de difícil higienização.

A Coqueluche é uma doença respiratória aguda causada pela bactéria *Bordetella pertussis*. Provoca ataques de tosse intensos que dificultam a deglutição e a respiração, podendo levar à pneumonia, convulsões, danos cerebrais e morte.

A Poliomielite é uma doença infectocontagiosa aguda. Apresenta-se na maioria dos casos de forma assintomática ou com sintomas inespecíficos, mas em 5 a 10% dos casos apresenta-se de forma grave, com quadro de paralisia importante, geralmente das pernas, que pode levar a uma seqüela permanente e até a morte.

• O que previne?

dTpa: Proteção contra difteria, tétano e coqueluche.

dTpa + VIP: Proteção contra difteria, tétano, coqueluche e Poliomielite.

dTpa: é indicada para pessoas a partir dos 4 anos de idade

Recomendada no 2º reforço para crianças a partir de 4 anos de idade. Em adolescentes, adultos e idosos, com esquema incompleto ou inexistente, recomenda-se 1 dose da dTpa + 2 doses da dT, no esquema 0-2-6, completando, assim, as 3 doses do componente tetânico. Necessário reforço a cada 10 anos.

dTpa + VIP:

É indicada para todas as pessoas a partir dos 3 anos de idade.

Pode ser administrada em adolescentes e adultos com história incompleta ou inexistente de vacinação prévia contra a difteria, tétano e coqueluche como parte de um esquema seguido de duas doses adicionais de vacina contendo difteria e tétano recomendadas com intervalo de um a seis meses após a primeira dose.



Vacina **DTPa**

Sintomas:

Difteria: Membrana grossa e acinzentada, cobrindo as amígdalas e podendo cobrir outras estruturas da garganta. Dor de garganta discreta. Glânglios inchados (linfonodos aumentados) no pescoço. Dificuldade em respirar ou respiração rápida em casos graves. Palidez. Febre não muito elevada. Mal-estar geral.

Tétano: Alterações neurológicas, espasmos musculares no rosto, pescoço, maxilar e abdômen, dor nas costas, braços e pernas, dificuldade para abrir a boca, insuficiência respiratória.

Coqueluche: No primeiro nível, o mais leve, os sintomas são parecidos com o de um resfriado. Mal-estar geral. Corrimento nasal. Tosse seca. Febre baixa.

Poliomielite: febre; mal-estar; dor de cabeça; dor de garganta e no corpo vômitos; diarreia; constipação (prisão de ventre); espasmos; rigidez na nuca.



Vacina **PENTAVALENTE**

Vacina combinada pentavalente para prevenção da Difteria, Tétano, Coqueluche acelular (Pertussis), Haemophilus b e Poliomielite.

Faixa etária:

Crianças a partir de 2 meses até 5 anos de idade.

Esquema de doses:

O esquema de vacinação primário consiste em 3 doses com intervalo de 2 meses.

Uma dose de reforço é recomendada no segundo ano de vida, com intervalo de pelo menos 6 meses após completar a primo vacinação.



Vacina **HEXAVALENTE**

Vacina combinada hexavalente para prevenção da Difteria, Tétano, Coqueluche acelular (Pertussis), Haemophilus b, Poliomielite e Hepatite B.

Faixa etária:

Imunização ativa de crianças a partir de 2 meses de idade.

Esquema de doses:

Vacinação primária é composta por três doses, normalmente aos 2, 4 e 6 meses de idade, a serem administradas em intervalos de 2 meses.



Vacina **HEPATITE A**

A Hepatite A é uma Infecção do fígado altamente contagiosa, causada pelo vírus da hepatite A.

• O que previne?

Vacina para prevenção da doença causada pelo vírus da Hepatite A, transmitido pela ingestão de alimento e/ou água contaminados por fezes de pessoas infectadas.

Faixa etária:

Faixa etária Hepatite A Inf: 12 meses até 18 anos

Faixa Etária Hepatite A Adt: A partir de 18 anos.

Esquema de doses:

Duas doses com intervalo mínimo de 6 meses.

4 meses a 5 anos incompletos: 1 dose sem reforço.

Adultos e Idosos: Dose única.

Sintomas:

Febre baixa, fadiga, mal-estar, perda do apetite, sensação de desconforto no abdomen, náuseas e vômitos



Vacina **HEPATITE B**

A Hepatite B é uma doença infecciosa que agride o fígado, sendo causada pelo vírus B da hepatite (HBV).

O HBV está presente no sangue e secreções, e a hepatite B é também classificada como IST (infecção sexualmente transmissível).

• **O que previne?**

Vacina para prevenção da doença causada pelo vírus da Hepatite B.

Além da doença aguda, a Hepatite B pode causar complicações a longo prazo como cirrose hepática, câncer de fígado e morte.

Faixa etária:

Neonatos, crianças e adolescentes até 19 anos de idade.

Esquema de doses:

Crianças: ao nascimento e aos 2 e 6 meses de vida.

Nas demais faixas etárias: primeira dose na data de escolha, segunda dose 1 mês após a primeira e terceira dose 6 meses após a primeira.

Pacientes com insuficiência renal, inclusive em hemodiálise, devem realizar 4 doses de volume dobrado, nos meses 0, 1, 2 e 6 após a data da primeira dose.

Sintomas:

Os principais sintomas relatados são anorexia, náusea, icterícia e desconforto no abdome, náuseas e vômitos.



Vacina **HEPATITE A+B**

Vacina combinada para prevenção das doenças causadas pelos vírus das Hepatites A e B.

Faixa etária:

É indicada para uso em adultos, adolescentes e crianças não imunes a partir de 1 ano de idade, em risco de contrair infecção pelos VHA e VHB.

Esquema de doses:

Crianças de 1 a 15 anos de idade: duas doses, esquema de 0 e 6 meses.

Adultos e adolescentes a partir de 16 anos: três doses com esquema de 0, 1 e 6. Esquema rápido para viajantes dentro de um mês: 0, 7 e 21 dias (quando tal esquema é aplicado, uma quarta dose 12 meses após a primeira é recomendada).



Vacina **MENINGO ACWY**

A meningite é uma inflamação nas meninges (membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal).

Pode ser causada por vírus e bactérias ou, de forma menos comum, por fungos, parasitas, medicamentos e tumores.

• **O que previne?**

Previne a doença meningocócica grave causada pela bactéria *Neisseria meningitidis* (meningococo) dos grupos A, C, W e Y, transmitida de pessoa para pessoa por contato próximo (via respiratória).

O meningococo apresenta vários sorogrupos na natureza, sendo os sorogrupos A, B, C, W e Y os mais frequentemente associados à doença invasiva, podendo causar meningite e infecção generalizada (septicemia) em qualquer faixa etária.

Faixa etária e Esquema de doses:

A partir do 3 mês de vida.

Sintomas:

Febre baixa, fadiga, mal-estar, perda do apetite, sensação de desconforto no abdome, náuseas e vômitos



Vacina **MENINGO B**

Imunização ativa contra a doença meningocócica invasiva causada pela *Neisseria meningitidis* do grupo B.

Faixa etária e Esquema de doses:

De 2 meses a 50 anos de idade.

Crianças de 3 a 5 meses: 2 doses com intervalo de 2 meses e 1 reforço entre os 12-15 meses.

Crianças de 6 a 11 meses: 2 doses com intervalo mínimo de 2 meses e 1 reforço no segundo ano de vida, com intervalo de pelo menos 2 meses entre a vacinação primária e a dose de reforço.

Crianças de 12 a 23 meses: 2 doses com 2 meses de intervalo e 1 reforço com intervalo de 12 a 23 meses após a vacinação primária. A partir de 2 anos: 2 doses com intervalo de 1 mês, sem necessidade de reforço estabelecida.

Obs: Em caso de prescrição médica solicitando 3 doses, seguimos a conduta médica com devido respaldo em bula.



Vacina **FEBRE AMARELA**

É uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido por mosquitos vetores, e possui dois ciclos de transmissão:

Silvestre: quando há transmissão em área rural ou de floresta

Urbano: transmitida principalmente pelo mosquito *Aedes aegypti*, o mesmo da dengue.

• O que previne?

Vacina para prevenção contra a Febre Amarela, doença viral transmitida por mosquitos que compromete órgãos vitais e pode ser grave e fatal.

Faixa etária:

Adultos e crianças acima de 9 meses de idade.

Esquema de doses:

Primeira dose a partir dos 9 meses e o reforço a partir de 4 anos de idade.

Iniciando o esquema a partir de 4 anos, dose única.

Uma dose de reforço pode ser considerada pelo risco de falha vacinal.

Para indivíduos que moram ou vão viajar para regiões endêmicas, fazer uma dose a cada 10 anos.

Sintomas:

Os sintomas mais comuns são febre, dores musculares com dor lombar, dor de cabeça, náusea ou vômito.



Vacina **FEBRE TIFÓIDE**

A Febre Tifoide é uma doença infecciosa causada por uma bactéria, a *Salmonella typhi*, transmitida por meio da ingestão de água e de alimentos contaminados.

É mais frequente em ambientes com baixas condições de saneamento básico.

• O que previne?

Previne a Febre Tifoide e deve ser repetida e administrada apenas quando a pessoa estiver em região endêmica.

Faixa etária:

Indicada para adultos e crianças a partir de 2 anos de idade, sendo especialmente recomendada para viajantes que se dirigem para áreas de risco, migrantes, profissionais de saúde e militares.

Esquema de doses:

Uma única dose que deve repetir-se a cada 3 anos caso o risco de contaminação permaneça.

Sintomas:

Febre alta, dor de cabeça, mal-estar geral, dor na barriga, falta de apetite, bradicardia (diminuição da frequência cardíaca), esplenomegalia (aumento do baço), manchas rosadas no tronco, tosse seca, dificuldade para evacuar ou diarreia.



Vacina **HERPES ZÓSTER**

É uma doença causada pelo mesmo vírus da catapora e que se manifesta quando a imunidade está baixa, sendo muito comum principalmente em pessoas acima dos 50 anos de idade.

É conhecida também como cobreiro, esse vírus causa lesões em locais específicos.

• **O que previne?**

Vacina para proteção contra o Herpes Zóster, doença causada pelo mesmo vírus da Varicela (ou Catapora).

Faixa etária:

Todas as pessoas a partir de 50 anos e adultos com 18 anos ou mais que tenham risco aumentado de contrair Herpes Zóster.

Esquema de doses:

Esquema vacinal de duas doses, com a segunda dose devendo ser administrada entre 2 a 6 meses após a primeira.

Sintomas:

Erupções, ou bolhas cutâneas, vermelhas e podem vir acompanhadas de dor ou coceira.



Vacina **GRIPE**

A Gripe é uma infecção respiratória aguda causada por subtipos de um vírus chamado Influenza.

As principais características da Gripe são o aumento do número de casos no outono e no inverno, alta transmissibilidade e período de incubação extremamente curto, o que propicia o surgimento dos surtos da doença.

• O que previne?

Protege de 4 subtipos do vírus Influenza (H1N1, H3N2 e 2 subtipos B), também chamada tetravalente. Vacina para proteção contra o vírus da Gripe.

Adt e Infantil: Recomendada a partir dos 6 meses de idade.

Crianças entre 6 meses e 9 anos incompletos: Caso estejam sendo vacinadas pela primeira vez devem receber duas doses, com intervalo de um mês entre as doses. Caso já tenham se vacinado em ano anterior, devem receber uma dose anual.

Crianças a partir dos 9 anos de idade, adolescentes e adultos: devem receber uma dose anual.

Enfluelda: Ela é indicada para indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos. Com esquema de uma dose anual.

Sintomas: Febre, calafrios, tremores, dor de cabeça, dores no corpo, perda de apetite, tosse (em geral seca), dor de garganta e coriza que duram cerca de uma semana.



Vacina **HAEMOPHILUS B**

A bactéria *Haemophilus influenzae* do tipo b (Hib), causa doença invasiva e grave, principalmente em crianças abaixo dos 5 anos de idade.

É transmitida de pessoa a pessoa por via respiratória.

• O que previne?

Vacina para prevenção contra a bactéria *Haemophilus influenzae* do tipo b (Hib), que causa meningite, pneumonia e epiglotite.

Faixa etária:

Idade entre 2 meses e 5 anos de vida.

Esquema de doses:

Crianças de 2 a 6 meses: 3 doses com intervalo de 1 ou 2 meses, seguidas de um reforço 1 ano após a terceira dose.

Crianças com idade entre 6 e 12 meses: 2 doses com intervalo de 1 ou 2 meses, seguidas de um reforço 1 ano após a segunda dose.

Crianças de 1 a 5 anos de idade: Dose única.

Sintomas:

Febre, dor de cabeça intensa, náuseas, vômitos e rigidez de nuca. Sequelas graves ocorrem de 3% a 5% dos sobreviventes de meningite por Hib como déficit auditivo grave e lesões cerebrais permanentes.



Vacina **HPV**

O HPV (Vírus do Papiloma Humano) é a infecção sexualmente transmissível mais comum em todo o mundo. Geralmente não apresenta sintomas, o que resulta em altos índices de transmissão sem o conhecimento e coloca o HPV entre os principais causadores de cânceres de colo do útero, vulva, vagina, pênis, ânus e garganta.

• **O que previne?**

Vacina para prevenção do Vírus do Papiloma Humano.

Vacina HPV 4-Valente Recombinante:

Proteção contra 4 subtipos de HPV.

Vacina HPV 9-Valente Recombinante:

Proteção contra 9 tipos de HPV.

Faixa etária:

Indicada a partir de 9 a 45 anos para mulheres e homens.

Esquema de doses:

9 a 14 anos de idade: 2 doses com intervalo de 6 meses.

A partir de 15 anos de idade: 3 doses, no esquema 0, 1-2 e 6 meses.

Sintomas:

Os sintomas podem incluir verrugas nos órgãos genitais ou na pele circundante. Não há cura para o vírus mas a vacinação pode prevenir a contaminação.



Pacote de vacinas **HERPES ZÓSTER**

Pacote 2 doses Vacina Herpes Zóster.

Esquema de doses:

Completo de duas doses. A segunda dose deve ser administrada entre 2 a 6 meses após a primeira dose.



Pacote de vacinas **HEXA + PNEUMO 13 + ROTAVÍRUS**

Hexavalente (DTPa + Hib + Pólio + Hepatite B)
Pneumocócica Conjugada 13-Valente + Rotavírus Pentavalente

Faixa Etária:

As vacinas deste pacote fazem parte do Calendário de Vacinação Infantil e são portanto indicadas para todas as crianças. Todas as vacinas incluídas no Pacote Hexa + Pneumo 13 + Rotavírus.

Esquema de doses:

Geralmente é realizada no 02º, 04º ou 06º mês vida.

**Obs: A caderneta de vacinação precisa ser avaliada por nossa equipe de enfermagem.*



Pacote de vacinas

PENTA + PNEUMO 13 + ROTAVÍRUS

Pentavalente (DTPa + Hib + Pólio)
Pneumocócica Conjugada 13-Valente
Rotavírus Pentavalente

Faixa Etária.

Comumente realizados aos 4 meses de vida.



Pacote de vacinas

MENINGITES ACWY + B

Pacote Meningites ACWY (GSK) + B.

Faixa Etária:

Todas as crianças a partir dos 3 meses de idade devem se vacinar contra o meningococo. Como a doença não tem predileção por faixa etária, adolescentes e adultos também devem se vacinar.

Esquema Vacinal:

de 30 a 60 dias de intervalo entre uma dose e outra.

**Obs: A caderneta de vacinação precisa ser avaliada por nossa equipe de enfermagem.*